## Stauden Sämerelen eigener Ernte von 1949

Karl Foerster, Potsdam - Bornim, Am Raubfang

and and and the series of the Court of the C

Züchtungs- und Forschungsbetrieb winterharter Blütenstauden

Fernruf: Potsdam 6210

Der neue
Pflanzenkatalog
1 9 50
geht Ihnen auf
Wunsch ab Mitte
Februar zu.

Hauptbedingung für Erfolge der Stauden-Heranzucht aus Samen ist der Schutz vor Sonnenbestrahlung und Austrocknung des Bodens. Wer kein Frühbeet hat, kann sich mit flachen Gruben helfen, auf welche Kistendeckel gelegt werden. Erst wenn alles kräftig keimt, entfernt man diese.

Eine Liste langjähriger Sondererfahrung in der Sämlings-Heranzucht von Stauden in übersichtlichen Zusammenfassungen wird auf Wunsch zuges sandt. Bei manchen Stauden ist Geduld vonnöten, sie brauchen zum Keimen oft mehr als 4 Wochen. (Helenium) Namensorten fallen nicht echt aus Samen, werden aber recht oft von einzelnen Sämlingen noch übertroffen.

\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
palar in the regions of the region of the re	10 g	Pt.
Althaea ficifolia, Staudenmalve, einfachbl., mannshoch	3.09	0,25
Alyssum rostratum, Sommersteinrich, goldgelb, fußhoch	2,80	0,25
Anemone pulsatilla, violette silberbehaarte Küchenschelle		1
Aquilegia vulgaris, bunte kurzspornige Akelei in Mischg.	2,20	
fl.pl., wie vorige, gefüllt	2,80	0,50
Armeria formosa gigantea, großköpfige Grasnelke in bun- tem Farbenspiel, bis kniehoch	8	0,80
Aster amellus,  Berg-Herbstaster, kniehoch, in Farbtönen vom hellsten Silberlila über Rosa, Rot bis zum tiefsten Lilavio- lett	4.00	0,60
- novi-belgii, hüfthoche glattblättrige Stauden- Herbstaster in Sortens		
Oktoberfest, hüfthoch, tiefblau, festgerbaut.		
Rosenquarz, brusthoch, Rosenquarzfarbe  Mount Everest, brusthoch, weiß, großblumig  Snowdrift, hüfthoch, schneeweiß  Taubenblau, hüft/brusthoch, silberblau		
in diesen Sorten gesondert  Mischung erprobter bester Sorten	6,00	0,40
- noavae-angliae, brusthoche Rauhblatt-Aster in Rosa Rot, Violettblau, Mischung erprobter bester Sonten	8,00	0,50

	was 2 sine		1 0	10 %	Pt.
	Zwerg-Herbstas in Sorten:	ter, fuß-bis kniehoch	<u>-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	-	#
	Lilac-Time, le Oktoberschucek	uchtend lilablau) uppel, schneeweiß	1		0,60
Athamanta Matthioli	, fußhoher Aug Filigrandolder	entrost mit weißen in grünem Netzwerk	0,60		0,40
Campanula carpathic	a, Karpathen-G Mischung blau-	Hockenblume, fußhoch, weißer Farben		2,80	0,50
- persicifol	is. pfirsichbl kniehoch, Misch	ättrige Glocke <b>nblume</b> nung blau-weißer Farber			0,60
Carlina caulescens	stricta, Silbe	erdistel, fußhoch. Es			
	Form von besteden liegend	r Haltung, nicht am Bo-			1
Chrysanthemum uligi	nosum, ungaris Marguerite, Se	sche brusthohe Sumpf-			0,50
Delphinium cultorum	Blaus hoher Qu standskraft. Au men zu ziehen.	ttersporn in vielen galität und Wider- gerst lohnend aus Sa- , In Sorten:	·		
	Berghimmel, hoo Fernzünder, mit telfrüh	ch, himmelblau, spät			
-	Finsterasrhom schwarz, mittel	n, hoch, enzianblau, und Lfrüh r Sorten ergibt einen			
Dianthus caesius,	besonders hohe	n Prozentsatz schöner Qualitäten obter Sorten spannhoch, zart-rosa.,		12	
cruentus,	samtrete Blut	nelke, kniehoch, echt			1,50
Eryngium planum,		stahlblaue Mannstreu- hoch	-	0,90	0,20
Gaillardia regalis	Kokardenblume de kniehohe S	, bekannte hervorragen chrittblume		4,40	0,35
- aristata n		en, fußhoch, daher auch		6	1
Helenium autumnale	Bornimer Züch	in Namensorten neuerer tungen, die zwar nie och interessante Ergeb	1		
Frühe Sc	rten (Eade Jul	Li/Anf.August erblühene	(£	1	
Kupfersprude	el, mannshoch,	rotbraun			
Rubinkuppel	11	samtdunkelbraun		17/	1
Kanaria,	hüfthoch,	hellgelb	1		
Goldfuchs,	11	goldbraun .			1
- Biedermeier,		zweifarbig gelb/braun			
Mahagoni,	31	rotbraun		Total	
Karneol,	11	rostrot			

		1444	
223		Mary.	
2000	· Y	- 145	

		g 10 g	Pt
	te Sorten (Mitte August erbleu. später:		
	, Sonnenberg, hüfthoch, gelb, braungester:		
	ackzwerg, tischhoch, tief dunkelbraun		
	tsonne, brusthoch, hellgelb		
Spätr			
Altgo.	ld hüfthoch, aprikosengelb		
	in diesen Sorten gesondertschung erprobter bester Sorten	5,60	0,,0
Hellopsis scabra,	Sonnenauge, tisch/brusthoch, Bornimer neue Hybriden, Mischung, geldgelbe wertvolle, haltbare Schnittblume, unentbehrliche, langeblühende Rabattenund Gruppenstaude des Hochsommers	1	0,30
	Bezüglich der Sorten gilt auch das von Helenium gesagte:		
-	Sommersonne großblumig.goldgelb )		
	Spitzentänzerin, längstblühende ) Aller, tiefstes Goldgelb ( Goldgrünherz, gefüllte Blüten mit)	3	0,80
	grünen Ornamenten im schönsten Gelb)		
Hypericum olympicum	n, Hartheu, liebliches Steingartenge- hölz mit leuchtend gelben Blüten,		
	spannhoch.		0,50
Inula ensifolia,	goldgelber Zwerg-Alant, spannhoch, langeblühend.		0,50
Lavandula vera,	echter Duft-Lavendel in winterhart er probter Sorte, kniehoch		0,40
Lavatera thuringia	ca, rosa Buschmalve, hüfthoher Dauer- blüher		0,50
Leucanthemum (Chrys	santhemum maximum(, Riesenmarguerite härtester Herkunft	1,30	0,25
Linum perenne,	Staudenlein, knieboher, leuchtend blauer Dauerblüher	0,7	0,20
Lupinus polyphyllus	s, Staudenlupine, Mischung vieler neu- artiger Farben der Russell-Lupinen, gleich gut für Schnitt und Stauden-		
	pflanzung.	2,80	0,40
Lychnis chalcedonic	Ca. Lichtnelke, hüfthohe "Brennende Liebe", scharlachrot		0,25
Malva moschata,	Pappelmelve, knichoch, langeblühende Schnitt-, Wild- und Rabattenstaude.		0,80
	Riesenmohn, Mischung bester Namensort	2,20	0,40
Platycodon grandifi	lorum Mariesii, Ballonglocke, kniehohe clematishafte, unverwüstliche Pracht-staude		0,80
Rudbeckia Sullivan	tii, braungesternter Sonnenbut, gelb- braun, reich- und langeblühend, von ungewöhnlicher Wirkung, auch zum Schni- fällt ECHT aus Semen! Stellt die alte	tt	
	Rudbeckia speciosa völlig in den Schaten	5-   .	ó,80

	1 g	10 g	Pt
Savia nemorosa superban echter violettblauer Sommer- salbei, e.c.h t aus Samen!			0,80
- officinalis, Salbei, mit blauen oder rosa Blumen, bekannt als Thee und Würzsalbei		0,50	
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, fußhoch, rosa, reich- blühend, starkwüchsige Steingarten- staude		1,30	0,25
Satureia montana compacta, Bergminze, weißrosa Steinga			0,40
- pymaea lilacina, wie vorige lila, beide wel	ct-		0,80
Sempavivum metallicum giganteum, Sandsteinrose; diese sowie die folgenden ergeben reizvolle Gebilde für Trockenmauern und Steinfugen			
ruthenicum, Fettblattsteinrose			1
tectorum, Donnerwurz)  Mischung erprobter Sorten und Arten			0,50
Stachys lanata, Silberwollzwist, dicht silbergrau b laubt, vielartig brauchbar im Garte spannhoch	e-	4,40	0,60
Thalictrum flavum, Blaublatt-Amstel, brusthoch, gelb-blühend		2,80	0,40
Verbascum clympicum, Königskerze, zweijährig; mannshock immer automatisch sich aussäende Prachtstaude.von.langer.Sommerblüte zeit. Gelbblühend	-	2,80	0,30
Veronica spicata, blauer Kerzen-Ehrenpreis, fuß-knie- hoch, in ausdauerndem Typ			0,30

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stiftung
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)